



A

AGROQUIMICOS



AgriCenter
ZeVilla

JUNTOS
GENERANDO
Valor

HERBICIDA / CONCENTRADO EMULSIONABLE

Folleto Técnico

Frontier® 2X

INGREDIENTES ACTIVOS: DIMETENAMIDA - P

Número de Registro RSCO-HEDE-0287-303-009-064

Clasificación toxicológica: 4

Formulación: Concentrado emulsionable

Marca tu territorio y protege el cultivo contra zacates con Frontier® 2X, el herbicida pre-emergente y de alta selectividad, adecuado al perfil del suelo.

CARACTERÍSTICAS

Frontier® 2X es un herbicida selectivo para controlar maleza de hoja ancha y angosta en los cultivos de PAPA y MAÍZ. Frontier® 2X es un producto que penetra principalmente por los coleóptilos de la maleza durante la germinación. Controla maleza susceptible reduciendo la división celular y el crecimiento como principal efecto de Dimetenamida-P. La maleza muere antes de germinar o recién emergida.

Frontier® 2X actúa bajo diferentes condiciones climatológicas, proporcionando un periodo de control sin problemas para la rotación de cultivos.

BENEFICIOS

Mejor cobertura y sellado del terreno.

Mayor periodo de control.

Compatible con otros herbicidas para ampliar el control de hojas anchas.

ÉPOCA DE APLICACIÓN

Frontier® 2X es un herbicida que debe aplicarse preemergencia al cultivo y a la maleza. No remueva la tierra durante 30 días después de haber aplicado Frontier® 2X ya que reduce su actividad herbicida. un mínimo de 300 a 450 L de agua por hectárea para asegurar una buena cobertura.

CULTIVO:

MAÍZ Y PAPA.

* CHECAR FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO PARA VER MALEZAS.

MALEZAS / ENFERMEDADES / PLAGAS

Quelite cenizo (*Chenopodium album*), Nabo silvestre (*Nabo silvestre*), Lentejilla (*Lepidium virginicum*), Aceitilla (*Aceitilla*), Tironia (*Tithonia tubaeformis*)

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Calibre el equipo de aplicación y asegúrese de que funcione adecuadamente a fin de determinar el gasto de agua y aplicar la dosis correcta. Para la aplicación de la mezcla, verter agua al tanque de mezclas hasta la mitad de su capacidad, posteriormente agregue la dosis de Frontier® 2X según el área a tratar, complete el llenado del tanque con agitación constante para asegurar que la mezcla sea homogénea. Utilice boquillas de abanico plano (8002-8004) procurando que el traslade permita un cubrimiento uniforme del terreno. Realice la aspersión con un mínimo de 300 a 450 L de agua por hectárea para asegurar una buena cobertura.

CONTRAINDICACIONES

Las aplicaciones deben realizarse por la mañana o por la tarde. No aplicar cuando haya amenaza de lluvia o cuando la velocidad del viento sea mayor a 15 km/h. No permita que el producto sea arrastrado por agua y/o viento hacia otro lugar que no sea el lugar objetivo. Frontier® 2X usado a las dosis y bajo las recomendaciones indicadas en esta etiqueta no causa ningún efecto fitotóxico en los cultivos aquí indicados.

INCOMPATIBILIDAD

Frontier® 2X no ha mostrado incompatibilidad al ser mezclado con otros productos agroquímicos oficialmente autorizados. Se recomienda aplicar Frontier® 2X solo.

UN PRODUCTO DE

BASF

We create chemistry

Importante.

La información contenida en este documento es correcta según nuestros conocimientos actuales. AgriCenter ZeVilla S.A. de C.V. no incurre en responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o integridad de dicha información, a menos que se señale explícitamente como garantizada. No se acepta responsabilidad explícita o implícita por la seguridad aptitud del producto para un propósito en particular o los resultados obtenidos de su uso. El comprador y usuario asumen los riesgos y responsabilidades por todos y cada uno de los perjuicios (incluso muerte), pérdidas o daños a personas y propiedades, derivados del uso de este producto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuencias.



AgriCenter
ZeVilla