



# A

## AGROQUIMICOS



AgriCenter  
ZeVilla

JUNTOS  
GENERANDO  
Valor

**REGULADOR DE CRECIMIENTO  
(COMPENSACIÓN DE HORAS FRÍO) / LÍQUIDO**

**REGISTRO:** RSCO-0025/11/95

## Folleto Técnico

# Dormex®

**INGREDIENTE ACTIVO:  
CIANAMIDA HIDROGENADA ESTABILIZADA**

Dormex® es un antidormante que influye en la fase de la dormancia de cultivos caducifolios. Dormex® aplicado sobre las ramas, adelanta la brotación floral y foliar y también así, la fecha de la cosecha. Dormex® uniformiza la floración, aumenta el número de frutas, facilita y mejora la eficiencia de las labores de cultivo y los controles fitosanitarios.

Dormex® produce una brotación completa de las yemas sobre la madera y ramas tratadas, y aumenta los rendimientos.

**COMPOSICIÓN PORCENTUAL  
CIANAMIDA HIDROGENADA ESTABILIZADA.....49%**

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Agregue agua limpia al tanque hasta la mitad, agregar la cantidad de Dormex® y un adherente. Agitar el caldo y llenar el tanque. El pH del agua debe encontrarse entre 6 y 7.

Dormex® sólo debe aplicarse con tractor.

Con excepción del uso en durazno se agrega un adherente a el volumen de aplicación depende del tamaño y de la densidad cultivo. Se debe asegurar una buena cobertura y mojar hasta el punto escurrimiento.

La aplicación se realiza con equipo motorizado usando una aspersión dirigida. La época de aplicación depende del objetivo, adelantar o uniformizar la brotación de las yemas, en lugares con heladas tardías se aplica 20-30 días antes de la fecha de la brotación normal.

Dormex® aplicado bajo temperaturas bajas extremas puede variar su desempeño. Se recomienda aplicar Dormex® solo o con adherente.

### BENEFICIOS

Aumento de los porcentajes de brotación.  
Uniformiza la brotación, disminuyendo costo de mano de obra.  
Adelanta la brotación y la cosecha, permitiendo el acceso a más mercados.  
Por sus estabilizadores y marcadores proporciona mayor seguridad en su manejo.

### CULTIVOS

Uva  
Manzano

### LOS RENDIMIENTOS.

CULTIVO	DOSIS Y MOMENTO DE APLICACIÓN	
Vid	4%	Aplicar inmediatamente después de la poda.
Uva de mesa	5%	Hacer las aplicaciones cuando no se tenga viento, ya que cultivos vecinos pueden ser afectados. Con excepción del uso en durazno, para una mejor adherencia y completo mojado agregar un coadyuvante no iónico del grupo de los organosiliconados. Regar normalmente después de la aplicación.
Manzano	1,5-4%	
Nogal pecanero	4%	
Nogal de castilla	3-5%	
Durazno	1-1,5%	
Ciruelo	1-1,5%	
	Por 100 L de agua	Por cilindro 200L
	1-5 L (1-5%)	2-10 L (1-5%)
<b>Tolerancia de residuos:</b> el producto se degrada totalmente.		

**Tiempo de re-entrada:** Una vez este totalmente seco el producto.

UN PRODUCTO DE

**BASF**  
We create chemistry

### Importante.

La información contenida en este documento es correcta según nuestros conocimientos actuales. Agricenter ZeVilla S.A. de C.V. no incurre en responsabilidad alguna con respecto a la exactitud o integridad de dicha información, a menos que se señale explícitamente como garantizada. No se acepta responsabilidad explícita o implícita por la seguridad aptitud del producto para un propósito en particular o los resultados obtenidos de su uso. El comprador y usuario asumen los riesgos y responsabilidades por todos y cada uno de los perjuicios (incluso muerte), pérdidas o daños a personas y propiedades, derivados del uso de este producto. Bajo ninguna circunstancia se aceptará responsabilidad por daños especiales, incidentales o consecuencias.



AgriCenter  
ZeVilla